METRO Misura circonferenze di tipo professionale

GIMA S.P.A. REF 27347 CE

Misuratore corporeo per la rilevazione della distribuzione del tessuto adiposo (sottocutaneo e viscerale,a livello del tronco).
Corpo in ABS con impugnatura ergonomica brevettata, nastro di misurazione in uno speciale materiale plastico indeformabile latex free, con doppia scala di valutazione colorata per le indicazione di rischio diviso, uomo e donna.
Utilizzabile per una precisa misurazione di tutte le circonferenze corporee grazie al suo bottone retrattile e al fermo flessibile che ne permette una lettura agevolata dei dati.

La particolare flessibilità del suo braccio in materiale termoplastico atossico, ne permette uno specifico uso in campo pediatrico come craniometro per la misurazione della circonferenza della testa del bambino.

Utilizzabile anche in ambito sportivo per una precisa misurazione antropometrica della circonferenza del braccio, per una rapida stima della massa muscolare del soggetto e per monitorare l'ipertrofia dell'atleta.

In ambito sanitario valuta in modo preciso la perdita o l'acquisto di massa magra dopo traumi o interventi chirurgici.

CIRCONFERENZA ADDOMINALE
RISCHIO DI COMPLICANZE METABOLICHE

LIVELLO DI RISCHIO	UOMINI	DONNE
LIVELLO 1 ZONA D'ALLERTA 1	≥ 94 cm	≥ 80 cm
LIVELLO 2 ZONA D'AZIONE 2	≥ 102 cm	≥ 88 cm

1 WHO Tech Rep Ser 2000;894(3):i-xii, 1-253. Mod da 1
2 Han, TS et al. - BMJ 1995; 311:1401-1405 Mod da 2

POSIZIONE DEL NASTRO
PER UNA CORRETTA MISURAZIONE
DELLA CIRCONFERENZA ADDOMINALE*



1. Paziente in posizione eretta.
2. Localizzare il margine superiore dell'anca e l'apice della cresta iliaca destra.
3. Posizionare il nastro orizzontalmente attorno all'addome a livello del margine superiore della cresta iliaca.
4. Prima di rilevare la misura assicurarsi che il nastro sia aderente, ma che non comprima la cute e che sia parallelo al pavimento.
5. Rilevare la misura al termine di una espirazione normale

*National Institutes of Health
The Pratical guide. Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults (October 2000)